

T/LPSXM

团 体 标 准

T/LPSXM 002—2019

水城黑山羊 羔羊饲养管理技术规范

Shuicheng Black Goat-Technical Specification for Lamb Feeding
and Management

2019 - 08 - 20 发布

2019 - 11 - 01 实施

六盘水市畜牧兽医学会

发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 羔羊饲养管理	1
5 断奶	2
6 保健	3

前 言

本标准为《水城黑山羊》系列团体标准中的一项。

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由六盘水市农业农村局提出。

本标准由六盘水市畜牧兽医学会归口。

本标准起草单位：六盘水市农业农村局、六盘水市市场监督管理局、水城县恒丰祥现代农业发展有限公司、六盘水市钟山区新世界三丫生态养殖农民专业合作社、水城县众鑫垚种养殖农民专业合作社。

本标准主要起草人：骆科印、付 强、王现科、蒙 燕、李文举、杨 芳、杨春艳、罗 祥、王关吉、宋振宇、张 军、左丽、沈宽泰、毛忠选、赵研、王春媛、赵娇、胡荣平、刘 畅。

水城黑山羊 羔羊饲养管理技术规范

1 范围

本标准规定了水城黑山羊羔羊的饲养与管理技术。

本标准适用于六盘水市境内水城黑山羊的羔羊饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

NY/T 5030 无公害农产品 兽药使用准则

NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

NY 5149 无公害食品 肉羊饲养兽医防疫准则

3 术语和定义

3.1

羔羊 Lamb

从出生到断奶前的羊只。

3.2

初乳 Colostrum

母羊产后 1 周内分泌的乳汁。

4 羔羊饲养管理

4.1 1~7 日龄

初产羔羊 1 小时内吃上初乳，最迟不得超过产后 12 小时。对初生弱羔、初产母羊或母性较弱的母羊所产的羔羊，需进行人工辅助羔羊哺乳或用代乳品哺乳。人工喂养羔羊要定时，每天 4~6 次；定量，每天每只 200 毫升，以后根据羊只的体重和健康状况酌情增减；定温，乳汁温度应接近或稍高于母羊的

体温，以 38~42℃为宜；定质，奶汁或乳品均应清洁、新鲜、未变质。注意羊舍内保暖防寒，舍内可设置保温灯来控制室温在 28~31℃，同时设置护羔栏，保持羊舍通风、干燥、明亮、安静、清洁。

4.2 8~20 日龄

羔羊在 10 日龄即可训练吃草料，如鲜草、干草或青贮饲料等，在羊舍内安装羔羊补饲栏，让羔羊自由采食，饮用清洁水，水质符合 NY 5027 规定要求，饮水中可适量加入保健类中草药。每只每天可补喂精料 50~100 克，饲料使用应符合 NY 5032 规定要求。

4.3 21~30 日龄

21 日龄后羔羊可随母羊一起放牧，注意确保双羔和弱羔的哺乳量，对缺奶羔和多胎羔羊应找代乳羊或人工哺乳。人工哺乳务必做到清洁卫生、定时、定量、定温，哺乳工具用后清洗，定期消毒，保持清洁。留作种用的羔羊在这一时期应使用塑料耳标进行个体编号，内容包括场名、出生日期、个体号等。

4.4 1~4 月龄

1 月龄后，羔羊逐渐转变为采食为主，除哺乳及放牧采食外，可补饲精饲料，要求含蛋白质多，粗纤维少，适口性好。1~2 月龄每天补饲精饲料两次，每次 150~200 克，3~4 月龄每天补饲精饲料三次，每次 200~250 克，饲料要多样化，以豆饼、玉米等混合料和优质干鲜草为宜。羊舍内设水槽和盐槽，也可在精饲料中混入 0.5%的食盐和 1%的矿物质。非留种小公羊，应于 30~35 日龄去势。

5 断奶

5.1 断奶日龄

农户养殖条件下，羔羊一般在 60 日龄（2 月龄）断奶。现代规模化养殖提倡早期断奶，可提前到 40 日龄左右断奶。

5.2 断奶方法

断奶时，在逐渐减少哺乳次数的同时增加饲喂次数，即断奶前一周，白天不哺乳，早晚各哺乳一次，一周后昼夜不喂奶，母子分群饲养管理。

5.3 断奶后饲养管理

羔羊断奶后要选择优良牧地放牧，圈养按性别、体重、体质强弱分别组群饲养管理，同时加强补饲，防止掉膘。

6 保健

6.1 消毒

6.1.1 消毒液

常用消毒药有 10~20% 的石灰乳和 10% 的漂白粉溶液。

6.1.2 消毒步骤

首先进行机械清扫羊舍内污物；然后喷洒消毒液消毒。

6.1.3 消毒方法

每年消毒两次（春、秋各 1 次），将消毒液（1 升/平方米）盛于喷雾器内对地面、墙壁、天花板等进行消毒。进羊前要开门窗通风，并用清水刷洗饲槽、用具，将消毒药味除去。对于产房，在产羔前及产羔结束后应进行一次彻底清扫消毒。

6.2 防疫

根据当地的疫情，预防“三炎一痢”（肺炎、肠胃炎、脐带炎及羔羊痢）、感冒及羊痘等，按 NY 5149 的规定要求注射相应疫苗。

6.3 驱虫

羔羊在 40~50 日龄进行第一次驱虫，80~90 日龄驱第二次，以后每隔 3 个月再驱一次。驱虫在早晨空腹时进行，喂药 6 小时内禁食。驱虫药物选择及使用按 NY/T 5030 规定执行。

6.4 卫生

羊舍、用具及周围场地做到清洁干燥，每天清除圈舍及周围的粪尿、污物，垫上干草或其他干燥松软的垫料，做好通风换气，圈舍始终保持清洁、干燥，空气新鲜，温度适宜。