



中华人民共和国水产行业标准

SC/T 7229—2019

鲤浮肿病诊断规程

Code of diagnosis for carp edema virus disease(CEVD)

行业标准信息平台

2019-08-01 发布

2019-11-01 实施



中华人民共和国农业农村部 发布

前言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由农业农村部渔业渔政管理局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会(SAC/TC 156)归口。

本标准起草单位:全国水产技术推广总站、北京市水产技术推广站。

本标准主要起草人:徐立蒲、余卫忠、张文、曹欢、王静波、王姝、潘勇、张锋、梁艳、王立新、李清。

行业标准信息服务平台

鲤浮肿病诊断规程

1 范围

本标准给出了鲤浮肿病的缩略语、试剂和材料、仪器和设备及临床症状,规定了采样、核酸检测及综合判定。

本标准适用于鲤浮肿病的流行病学调查、诊断、监测和检疫。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 18088 出入境动物检疫采样

SC/T 7103 水生动物产地检疫采样技术规范

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CEV:鲤浮肿病毒(carp edema virus,CEV);

CEVD:鲤浮肿病(carp edema virus disease,CEVD)。

4 试剂和材料

4.1 CEV 阳性物质:由农业农村部指定的水生动物病原微生物菌(毒)种保藏机构提供。

4.2 水:符合 GB/T 6682 中一级水的要求。

4.3 无水乙醇:分析纯,使用前预冷到 -20°C 。

4.4 荧光 PCR $2\times$ 预混合液($2\times$ probe master mix),商业试剂, -20°C 保存。

4.5 套式 PCR $2\times$ 预混合液($2\times$ master mix),商业试剂, -20°C 保存。

4.6 环介导等温扩增 $2\times$ 反应缓冲液,商业试剂, -20°C 保存。

4.7 Bst 酶: -20°C 保存,酶浓度为 $8\text{ U}/\mu\text{L}$,避免反复冻融。

4.8 引物:荧光 PCR 和套式 PCR 引物浓度为 $10\text{ }\mu\text{mol/L}$,LAMP 引物浓度为 $100\text{ }\mu\text{mol/L}$, -20°C 保存。

4.8.1 荧光 PCR 引物

上游引物 qF1:5'-AGTTTTGTAKATTGTAGCATTTCC-3';

下游引物 qR1:5'-GATTCCTCAAGGAGTTDCAGTAAA-3';

探针:5'-FAM-AGAGTTTGTCTTCTTGCCATACAAACT-BHQ1-3';

扩增 CEV P4a 蛋白基因中 76 bp 的片段。

4.8.2 套式 PCR 引物

4.8.2.1 F1 和 R1 扩增 CEV P4a 蛋白基因中的 548 bp 片段,F2 和 R2 从该片段中再扩增 180 bp 片段。

上游引物 F1:5'-GCTGTTGCAACCATTTGAGA-3';

下游引物 R1:5'-TGCAGGTTGCTCCTAATCCT-3';

上游引物 F2:5'-GCTGCTGCACTTTTAGGAGG-3';

下游引物 R2:5'-TGCAAGTTATTTCGATGCCA-3'。

4.8.2.2 BF 和 BR 扩增 CEV P4a 蛋白基因中的 528 bp 片段,IF 和 IR 从该片段中再扩增 478 bp 片段。

上游引物 BF:5'-ATGGAGTATCCAAAGTACTTAG-3';

下游引物 BR: 5'-CTCTTCACTATTGTGACTTTG-3';

上游引物 IF: 5'-GTTATCAATGAAATTTGTGTATTG-3';

下游引物 IR: 5'-TAGCAAAGTACTACCTCATCC-3'。

4.8.3 LAMP 引物

F3: TCCCACAGAATGTAATCTCAA;

B3: ACCTCATCCAAATTACGTAGT;

FIP: GTCTGTCTTCGATAAGACAATGACT-TGTGGAGTTTTTGAAGTATACTGT;

BIP: TCAATCTGAATTCCTTTCCAGAACA-CGTTGATACAATTCCAGAGC;

LF: TGCTCTAGTTCTAGGATTGT;

扩增 CEV P4a 蛋白基因片段。

5 仪器和设备

5.1 组织研磨器。

5.2 高压灭菌锅。

5.3 普通冰箱。

5.4 超低温冰箱。

5.5 低温离心机。

5.6 生物安全柜。

5.7 荧光 PCR 仪。

5.8 PCR 仪。

5.9 可控温水浴锅。

6 临床症状

发病鱼行动迟缓,有时呈昏睡症状。病鱼的症状包括:烂鳃、眼球凹陷、体表糜烂、出血、皮下组织水肿、吻端和鳍的基部溃疡等。其中最常见的症状是包括烂鳃在内的鳃丝损害症状。鳃组织在低倍镜观察显示上皮细胞的过度增殖导致鳃丝肿胀;高倍镜下表现出鳃细胞水肿、重度增生、鳃小片相互融合以及上皮细胞脱落。参见附录 A 的 A.6。

7 采样

按 SC/T 7103 的规定执行。取样数量按 GB/T 18088 的规定执行。体长 ≤ 4 cm 的鱼取整条;带卵黄囊的鱼去掉卵黄囊;体长 4 cm~6 cm 的鱼苗取鳃及所有内脏;体长大于 6 cm 的鱼则取鳃、肾。

8 核酸检测

8.1 DNA 抽提

8.1.1 将样品匀浆后按 1:10 比例添加 PBS 缓冲液或细胞培养液,冻融 1 次,1 000 r/min 离心 10 min 后,取 450 μ L 上清液。加入到 1.5 mL 的离心管中。

8.1.2 加入 450 μ L CTAB 溶液(见附录 B 的 B.1)混匀。25℃处理 2 h~2.5 h。

8.1.3 加入 600 μ L 抽提液 1(见 B.2),混合混匀至少 30 s。12 000 r/min 离心 5 min,取上层水相(约 800 μ L)置于新的 1.5 mL 离心管中。

8.1.4 加入 700 μ L 抽提液 2(见 B.3),充分混匀至少 30 s。12 000 r/min 离心 5 min,取上层水相(约 600 μ L)置于新的 1.5 mL 离心管中。

8.1.5 加入-20℃预冷的 1.5 倍体积的无水乙醇(约 900 μ L),倒置数次混匀后,-20℃沉淀核酸 8 h 以上。

8.1.6 12 000 r/min 离心 30 min, 小心弃去上清液。干燥 5 min~10 min 后加 11 μ L DEPC 水溶解, 用作 PCR 模板。

8.1.7 也可采用同等功效的核酸抽提试剂盒。

8.2 设立对照

设立阳性对照、阴性对照和空白对照。取已知含有 CEV 的阳性样品组织作为阳性对照; 取 CEV 检测阴性的健康鱼组织作为阴性对照; 取等体积的无菌去离子水代替模板作为空白对照。

8.3 荧光 PCR

8.3.1 反应体系

2 $\times$ 预混合液(2 $\times$ probe master mix)10 μ L、引物 qF1 和 qR1 各 0.8 μ L、探针 0.4 μ L、模板 2.5 μ L、加 DEPC 水至 20 μ L。瞬时离心, 将 PCR 管置于荧光 PCR 仪。

8.3.2 反应条件

95 $^{\circ}$ C 2 min; 95 $^{\circ}$ C 5 s, 56 $^{\circ}$ C 31 s, 共 40 个循环。

8.3.3 结果判定

阴性对照和空白对照应无 C_t 值; 阳性对照 C_t 值 $\leq$ 35, 且出现典型扩增曲线, 反应成立。待测样品 C_t 值 $\leq$ 35 且出现典型扩增曲线, 可判为 PCR 阳性; 若待测样品无 C_t 值, 或无扩增曲线, 可判为 PCR 阴性。待测样品 C_t 值 $>$ 35, 应进行一次重复检测。若重复检测后结果相同, 可判为 PCR 阳性; 否则判为 PCR 阴性。

8.4 套式 PCR

8.4.1 引物 F1/R1 和 F2/R2 分别扩增 CEV P4a 蛋白基因中 548 bp 和 180 bp 的片段

反应体系(50 μ L)为 2 $\times$ 预混合液(2 $\times$ master mix)25 μ L, 引物 F1、R1 各 2 μ L, 模板 5 μ L, DEPC 水补至 50 μ L。反应条件为 95 $^{\circ}$ C 预变性 4 min, 95 $^{\circ}$ C 变性 1 min, 55 $^{\circ}$ C 退火 1 min, 72 $^{\circ}$ C 延伸 1 min, 35 个循环后 72 $^{\circ}$ C 再延伸 10 min。如果第一步 PCR 后的产物在电泳时看不到特异的 DNA 带, 取 5 μ L 产物作模板; 如果第一步 PCR 后的产物在电泳时能看到特异的 DNA 带, 则需将产物按 1:100~1:1 000 稀释, 取 5 μ L 稀释后产物作模板, 反应条件同上, 加入引物 F2、R2 进行套式 PCR 扩增。

8.4.2 引物 BF/BR 和 IF/IR 分别扩增 CEV P4a 蛋白基因中 528 bp 和 478 bp 的片段

反应体系(50 μ L)为 2 $\times$ 预混合液(2 $\times$ master mix)25 μ L, 引物 BF、BR 各 2 μ L, 模板 5 μ L, DEPC 水补至 50 μ L。反应条件为 95 $^{\circ}$ C 预变性 4 min, 95 $^{\circ}$ C 变性 1 min, 45 $^{\circ}$ C 退火 1 min, 72 $^{\circ}$ C 延伸 1 min, 35 个循环后 72 $^{\circ}$ C 再延伸 10 min。如果第一步 PCR 后的产物在电泳时看不到特异的 DNA 带, 取 5 μ L 产物作模板; 如果第一步 PCR 后的产物在电泳时能看到特异的 DNA 带, 则需将产物按 1:100~1:1 000 稀释, 取 5 μ L 稀释后产物作模板, 反应条件同上, 加入引物 IF、IR 进行套式 PCR 扩增。

8.4.3 琼脂糖电泳

用 1 $\times$ 电泳缓冲液(见 B.4)配制 2% 的琼脂糖凝胶(含 0.5 μ g/mL EB, 见 B.5, 或其他等效商品化试剂)。将 5 μ L 样品和 1 μ L 6 $\times$ 上样缓冲液(见 B.6)混匀后加入样品孔, 在电泳时设立 DNA 标准分子量作对照。5 V/cm 电泳约 0.5 h, 当溴酚蓝到达底部时停止, 将凝胶置于凝胶成像仪上观察。

8.4.4 测序

取 PCR 产物进行基因序列测定, 将测序结果与 GenBank 中参考序列(见附录 C)进行同源性比对。

8.4.5 结果判定

PCR 扩增后, 阳性对照会出现特异的 DNA 带, 阴性对照和空白对照均没有该条带, 反应成立。待测样品第一步 PCR 扩增有特异的 DNA 带(548 bp 或 528 bp), 或第二步 PCR 扩增后有特异的 DNA 带(180 bp 或 478 bp), 并经基因测序确定是 CEV 的, 可判为 PCR 阳性; 未扩增出条带的, 或条带大小与特异的 DNA 带大小不一致, 或经基因测序确定不是 CEV 的, 判为 PCR 阴性。

8.5 LAMP 检测

8.5.1 反应体系

LAMP 2 $\times$ 反应缓冲液(含 dNTP)12.5 μ L, 8 U Bst DNA polymerase 1 μ L, 钙黄绿素(FD) 1 μ L(包含有

0.5 mmol/L 钙黄绿素和 10 mmol/L MnCl_2), FIP 0.4 μL , BIP 0.4 μL , F3 0.1 μL , B3 0.1 μL , LF 0.2 μL , 模板 2 μL , DEPC 水补至 25 μL 。

8.5.2 反应条件

可控温水浴锅中, 63℃ 恒温反应 60 min, 80℃ 下恒温反应 5 min 以结束反应。轻轻混匀并在黑色背景下观察。

8.5.3 结果判定

阴性对照及空白对照反应管液体呈橙色, 阳性对照反应管液体呈绿色, 则反应成立; 待测样品反应管液体呈绿色, 则判为核酸阳性; 待测样品反应管液体呈橙色, 则判为核酸阴性。

9 综合判定

9.1 可疑判定

养殖的鲤或锦鲤出现临床症状, 或 CEV 核酸阳性时判定为疑似。

9.2 确诊判定

养殖的鲤或锦鲤出现临床症状, 荧光 PCR、套式 PCR、LAMP 检测中任何一种方法检测结果阳性, 判定为 CEVD 阳性。

养殖的鲤或锦鲤无临床症状, 荧光 PCR、套式 PCR、LAMP 检测中任何一种方法检测结果阳性, 判定为 CEV 核酸阳性。

行业标准信息服务平台

附录 A
(资料性附录)
鲤浮肿病(CEVD)

A.1 疾病描述

鲤浮肿病(carp edema virus disease, CEVD), 也称锦鲤昏睡病(koi sleepy disease, KSD), 是一种由鲤浮肿病毒(carp edema virus, CEV)引起鲤和锦鲤死亡的一种病毒性传染病。

A.2 危害对象

各种规格的鲤、锦鲤。

A.3 流行水温

该病在水温 7℃~27℃ 均有发生。

A.4 临床症状

同池养殖的鲤或锦鲤行动迟缓, 常聚集在池塘的水面或边缘处, 或静置在池塘中, 或在池底不动, 呈昏睡状态。当受到触动时, 病鱼会游动, 但很快又继续处于昏睡状态。病鱼的症状包括: 烂鳃、眼球凹陷、体表糜烂、出血、皮下组织水肿、吻端和鳍的基部溃疡等。其中最常见的症状是包括烂鳃在内的鳃丝损害症状。CEV 感染的鳃组织的病毒载量显著地高于肾、脾、表皮和肠腔等组织。鳃组织在低倍镜观察显示上皮细胞的过度增殖导致鳃丝肿胀; 高倍镜下表现出鳃细胞水肿、重度增生、鳃小片相互融合以及上皮细胞脱落。

鲤浮肿病与锦鲤疱疹病毒病均具有烂鳃、眼凹陷等相似的症状, 导致养殖者经常把 CEVD/KSD 误认为是锦鲤疱疹病毒病。因此在养殖生产中, 当鲤或锦鲤出现烂鳃等症状, 并有高死亡率时, 应同时进行鲤浮肿病和锦鲤疱疹病毒病的检测, 以确定病原。

人工感染试验的结果显示: 感染后到鱼发病, 体内各组织内的病毒量达到最大值, 然后逐渐下降, 12d 后几乎为零。在流行病学调查中也发现, 不久前刚发病恢复不久的渔场, 即便在发病时显示有典型的 CEVD 临床症状, 但在恢复期也很难检测到病毒。因此, 在采样时需要注意这个问题。

A.5 病原

鲤浮肿病毒(carp edema virus, CEV), 隶属于痘病毒科(Poxviridae), 其基因是线性双链 DNA(dsDNA)。目前已知痘病毒科分为脊椎动物痘病毒亚科和昆虫痘病毒 2 个亚科, 而 CEV 属于未定亚科的痘病毒, 其大小约 200 nm×400 nm。

A.6 鳃丝显微镜观察

见图 A.1。




图 A.1 正常和发病锦鲤鳃丝显微镜观察

附 录 B
(规范性附录)
试剂 及其 配制

B.1 CTAB 溶液(hexadecyl trimethy ammonium bromide, 十六烷基三甲基溴化铵)

CTAB:按 CTAB 2%,NaCl 1.4 mol/L,EDTA 20 mmol/L,Tris-HCl 20 mmol/L pH 7.5 配制。配制时在 60 mL 水中顺序加入:8.19 g NaCl,0.744 g EDTA,1.21 g Tris,0.25 mL~0.3 mL 浓 HCl,调整 pH 为 7.5~8.0,再加入 2 g CTAB,搅拌待完全溶解后加水到 100 mL。使用前,需加巯基乙醇至终浓度为 0.25%。

B.2 抽提液 1

1 mol/L Tris 饱和酚:氯仿:异戊醇按 25:24:1 混合,密闭避光保存。

B.3 抽提液 2

将氯仿:异戊醇按 24:1 的比例混合,密闭避光保存。

B.4 5×电泳缓冲液

Tris	54 g
硼酸	27.5 g
EDTA	2.922 g
水	1 000 mL

用 5 mol/L 的 HCl 调到 pH 8.0。

B.5 EB(ethidium bromide, 核酸染色剂)

用水配制成 10 mg/mL 的浓缩液。使用时,每 10 mL 电泳液或琼脂中加 1 μ L。

B.6 6×上样缓冲液

蔗糖	40 g
加水溶解,定容至	100 mL
溴酚蓝	0.25 g

溶解后,4℃保存。

附 录 C
(规范性附录)
PCR 扩增的序列

C.1 荧光 PCR 扩增产物的参考序列(76 bp)

AGTTTTGTATATTGTAGCATTTCCCTAGTTTGTATGGCAAGAAACAACTCTCTTTACTGTAA
CTCCTTGAGGAATC

注:划线处为引物序列,其中荧光 PCR 扩增产物引物序列依次是 qF1、探针、qR1。

C.2 套式 PCR 扩增产物的参考序列(548 bp)

GCTGTTGCAACCATTTGAGAATGAACTGAATCAACAAGTTGATATGCTTTGCATTTGCATCA
AAAGCAACAACCTGACGAGGGAATGATTGAGACAAAGTAGAGCTTCTTGTGTAATGCATAT
CTTGAGAAGCACGCTGCTCCACCTGCTACAATTCCAAGAGCATAATGATATTCAAGATCTAG
TCTAATTTGATCTGGAGAATAAGTATATGCTTTGATTCCATACAGTTTAATGAAATGCTCA
TAATTACCTTGTCCAAACAAAGTTAGATAAAATAGTTTTAGGATTGAAGCAAGAGCTGCTG
CACTTTTAGGAGGACAAGTAAAGTTACCACCAGCTCCTACAAGGAAAGCAATTGATTTTAT
ACTTGAAGAACATTCAAGAAGATTAGAGAAATTCTCAAGAATTAGAATTGCAACTTCTAGT
CTCTCTAGTTTTTCTAGATTTAGATTTAGGTTGGCATCGAAATAACTTGCATAATCTAGAA
GTTTCATCAACATCAAATGTACTTACATCAAATAGGAAAGGATTAGGAGCAACCTGCA

注:划线处为引物序列,其中套式 PCR(548 bp)扩增产物引物序列依次是 F1、F2、R2、R1。

C.3 套式 PCR 扩增产物的参考序列(528 bp)

ATGGAGTATCCAAAGTACTTAGATTAATGTTATCAATGAAATTTGTGTATTGTGTTTT
TGTTAGTCCAAGAGTTTTCTTTTCGTCATTTGTTACTTTTTGTAGTTGTTTAATATTTGTGA
TAAGATTTCCATTGGCATAAAATCCTTCCCAGATTTGGGTTGAAACATGTTTTAGAGTTTTG
TATATTGTAGCATTTCCCTAGTTTGTATGGCAAGAAACAACTCTCTTTACTGTAACTCCTTG
AGGAATCTGATCTAGAATTCCACAATATGTAATCTCAAATTTGTTTGTGGAGTTTTTGAAA
TATACTACTTCATCATACAATCCTAGAACTAGAGCAAGATTAGAAGTCATTGTCTTGTCAAA
GACAGACATCTTATTCCAATCATCAATCTGGATTTCCTTTCCAGAACATAACATTTGCAATTT
TAAGTCTGCTCTGGAATTGTATCAACGTATCCAATATCTTTCTTTACTACGTAATTTGGATGA
GGTAGTACTTTGCTAACAAAGTCACAATAATGAAGAG

注:划线处为引物序列,其中套式 PCR(528 bp)扩增产物引物序列依次是 BF、IF、IR、BR。

C.4 LAMP 检测扩增产物的参考序列(300 bp)

TCTTTACTGAACTCCTTGAGGAATTTGATCTAGAATCCCACAGAATGTAATCTCAAAT
TTGTTTGTGGAGTTTTTGAAGTATACTGTTTCATCATACAATCCTAGAACTAGAGCAAGAT
TAGAAGTCATTGTCTTATCGAAGACAGACATCTTATTCCAATCATCAATCTGAATTCCTTTC
CAGAACATAACATTTGCAATTTTAACTTGCTCTGGAATTGTATCAACGTATCCAATATCTTT
CTTTACTACGTAATTTGGATGAGGTAGTACTTTGCTAACAAAGTCACAATAGTGAA

注:划线处为引物序列,其中 LAMP 检测扩增产物引物序列依次是 F3、IF2、LF、IF1、B1、B2、B3。



行业标准信息服务平台

中华人民共和国

水产行业标准

鲤浮肿病诊断规程

SC/T 7229—2019

* * *

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码: 100125 网址: www.ccap.com.cn)

中农印务有限公司印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2019年10月第1版 2019年10月北京第1次印刷

书号: 16109·4861

定价: 20.00 元



SC/T 7229—2019

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 59194261